

# Movicol Junior - behandling af spædbørn op til 6 måneder



## Jeres barn skal i behandling med Movicol Junior

Movicol Junior er et afføringsmiddel. Det virker ved at binde vand i tarmens indhold og dermed sørge for at afføringen i tarmen bliver blød. Når afføringen er blød, er den lettere at få ud. Den afførende virkning indtræder sædvanligvis efter 12-24 timer

Movicol Junior er et hvidt pulver, som skal blandes op i modermælk eller modermælkserstatning. Movicol Junior købes på apoteket i håndkøb. For at få den rigtige virkning er det meget vigtigt, at pulveret blandes i den mængde væske der er angivet i anvisningen herunder.

### Blandingsanvisning:

Et brev Movicol Junior indeholder 10 ml pulver.

$\frac{1}{4}$  brev, altså 2,5 ml Movicol Junior blandes op i min. 16 ml mælk.

$\frac{1}{2}$  brev, altså 5,0 ml Movicol Junior blandes op i min. 32 ml mælk

Man kan godt blande yderligere væske i, hvis man er sikker på at barnet kan drikke hele mængden.

Blandingen kan opbevares tildækket i køleskab op til 24 timer efter opløsning. Vær opmærksom på at pulveret bliver helt opløst.

**Dosisstart er  $\frac{1}{4}$  brev, altså 2,5 ml Movicol Junior gange to dagligt. Kan øges til  $\frac{1}{2}$  brev, altså 5,0 ml Movicol Junior gange to dagligt.**

Til at begynde med kan det være lidt svært at finde frem til den rigtige dosis, men I må prøve jer frem. Det vigtigste er, at jeres barn har mindst en blød afføring dagligt uden smerter eller andet ubehag.

Movicol til voksne kan købes billigere på apoteket. Ved køb af dette præparat skal I være opmærksomme på ændret doseringsforhold, og I skal rådføre jer med apoteket eller egen læge.

Hvis I har spørgsmål til behandlingen, skal I kontakte jeres praktiserende læge eller jeres sundhedsplejerske.

Ved særlige tilfælde kan sundhedsplejerskerne på Neonatalafsnittet kontaktes på:

Tlf.: 3862 3103 mandag – fredag kl. 09.00-14.00